Aprobado para tratar todos los grados de psoriasis en placas y artropatía psoriásica activa

Felicitaciones por comenzar su viaje con Otezla

Aquí encontrará información clave para aprovechar al máximo su tratamiento

Para pacientes con seguro comercial

Comience a utilizar la tarjeta de copago de Otezla

*Se aplican criterios de elegibilidad y máximos del programa.
Visite AmgenSupportPlus.com/copay-terms para conocer los términos y condiciones completos.

HAGA CLIC PARA INSCRIBIRSE

USOS APROBADOS

Otezla® (apremilast) es un medicamento recetado que se usa para tratar las siguientes enfermedades en pacientes adultos:

- Psoriasis en placas para quienes la fototerapia o el tratamiento sistémico son apropiados.
- Artropatía psoriásica activa.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE ESPECÍFICA

No debe tomar Otezla si es alérgico al apremilast o a cualquiera de los ingredientes de Otezla.

Haga clic aquí para obtener la información de prescripción completa

Dé el siguiente paso e inscríbase en el Programa de copago* de Otezla

Los pacientes con seguro comercial pueden inscribirse y **pagar desde $0*** por Otezla

Escanee el código QR para inscribirse en el Programa de Copago de Otezla.

Reciba su tarjeta de copago digital hoy mismo por correo electrónico.

Comparta el número de identificación de miembro con su farmacia especializada y pague desde $0* por Otezla.

Haga clic para inscribirse
o visite
Otezla.com/enroll

El 95% de las recetas de Otezla tienen un costo de bolsillo de $0 para las personas inscritas en el Programa de Tarjeta de Copago de Otezla*.

¿Cómo funciona el Programa de Copago de Otezla?
Si tiene un seguro comercial a través de su empleador, generalmente paga el costo "de bolsillo" por Otezla, que es la cantidad que debe pagar después de que se hayan aplicado la cobertura de su seguro, los copagos y los deducibles. El Programa de Copago de Otezla reduce la tarifa fija (el copago) que usted paga cada vez que surte su receta de Otezla, de modo que paga menos de su bolsillo por el medicamento.

¿Medicaid, Medicare, sin seguro o con seguro insuficiente?
Los pacientes que no sean elegibles para el Programa de copago de Otezla seguirán contando con nuestro apoyo, sin importar su situación económica. Regístrese en Amgen SupportPlus para acceder a información sobre cómo surtir su receta y reducir los costos de bolsillo.

*Se aplican criterios de elegibilidad y máximos del programa.
Visite AmgenSupportPlus.com/copay-terms para conocer los términos y condiciones completos.

Haga clic aquí para obtener la información de prescripción completa

Otezla® (apremilast) 30mg tablets

Puede empezar a tomar Otezla de inmediato

Paquete de inicio

Es posible que reciba un paquete de inicio de muestra en el consultorio del médico para que pueda empezar el tratamiento. El resto de su receta se obtendrá a través de una farmacia especializada. Las farmacias especializadas ofrecen a los pacientes un apoyo exhaustivo con medicamentos especializados.

Sin análisis de sangre de rutina

Con Otezla no se necesitan análisis de sangre iniciales ni continuos antes de empezar el tratamiento.

Cómo surtir su receta de Otezla en una farmacia especializada

Su médico enviará la receta a una farmacia especializada.

La farmacia especializada le llamará para coordinar la entrega.

La receta de Otezla se entregará en su domicilio.

Guarde la información de contacto de la farmacia

Guarde la información de contacto de la farmacia para evitar que aparezca como número desconocido. Si no recibe noticias de la farmacia especializada en el plazo de una semana, comuníquese con su médico.

Otezla® (apremilast) 30mg tablets

Haga clic aquí para obtener la información de prescripción completa

Otezla se adapta a sus horarios



Toma de Otezla

Otezla es un comprimido que se toma dos veces al día, una vez por la mañana y otra por la noche. Las personas con enfermedad renal grave tomarán un comprimido al día.

Uso del envase de comprimidos

Otezla se presenta en un envase de comprimidos fácil de seguir que le ayudará a respetar un programa para saber cuándo y cómo debe tomar el medicamento. Las personas con enfermedad renal grave seguirán un programa diferente.

Adaptación a Otezla

Su dosis se ajustará o aumentará durante los primeros 5 días de tratamiento hasta alcanzar la dosis recomendada. Esto ayudará a reducir posibles efectos secundarios en el aparato digestivo. Si omite una dosis, hable con su médico para saber cuándo debe tomar la siguiente. No duplique la dosis.

	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6 y posteriores
A. M	10 mg	10 mg	10 mg	20 mg	20 mg	30 mg
P. M.	—	10 mg	20 mg	20 mg	30 mg	30 mg

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE ESPECÍFICA

Otezla puede provocar reacciones alérgicas que, en ocasiones, pueden ser graves. Suspenda el uso de Otezla y llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave: dificultad para respirar o tragar, bultos elevados (urticaria), erupción o picazón, o hinchazón del rostro, labios, lengua, garganta o brazos.

Establezca una rutina

Cree un hábito: incluya la toma de Otezla en alguna actividad de su rutina diaria, por ejemplo, cuando se cepille los dientes.

Controle su progreso: realice un seguimiento de sus resultados durante un máximo de 90 días antes de evaluar si Otezla es adecuado para usted.

Deje un recordatorio: configure una alarma en su teléfono o deje una nota en el mostrador que le recuerde tomar Otezla.

Evalúe su experiencia: anote sus síntomas cada semana después de empezar a tomar Otezla y comparta estas observaciones con su médico.

Haga clic para acceder a los **Rastreadores de síntomas de Otezla** para lo siguiente:

Psoriasis en placas

Artropatía psoriásica

“Solo tomo una pastilla por la mañana, otra por la noche y listo”.

Kayla
Paciente real de Otezla*

*Los pacientes han recibido una compensación por su tiempo.

Haga clic aquí para obtener la información de prescripción completa

Otezla® (apremilast) 30mg tablets

Observe resultados con un comprimido que trata desde el interior

Observe los resultados de Otezla

- En un estudio de 595 adultos con psoriasis en placas de leve a moderada, el 22% de las personas que tomaron Otezla consiguieron una piel más clara al cabo de 4 meses, en comparación con el 4% de las personas que tomaron placebo.
- En un estudio de 844 adultos con psoriasis en placas de moderada a grave, el 33% de las personas que tomaron Otezla consiguieron una piel más clara al cabo de 4 meses en comparación con el 5% de las personas que tomaron placebo.

*Resultados en pacientes reales con psoriasis en placas (PsO) de moderada a grave que toman Otezla. No todos los pacientes responden al tratamiento. Los que lo hacen pueden responder de forma diferente.

Haga clic para saber más de los pacientes

Otezla también trata la artropatía psoriásica

Después de 4 meses de tratamiento:

- Reduce la hinchazón de las articulaciones y el dolor a la palpación.
- Reduce el dolor en las articulaciones.
- Otezla podría mejorar su capacidad para realizar actividades físicas cotidianas.



“Estoy agradecida por los resultados que he observado con este tratamiento”.

Cindy
Paciente real de Otezla*

*Los pacientes han recibido una compensación por su tiempo.

La experiencia de cada uno es diferente.
Dado que Otezla necesita tiempo para actuar, es posible que no observe resultados de inmediato. Sin embargo, algunas personas observaron resultados **después de solo 4 meses.**

Otezla® (apremilast) 30mg tablets

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE ESPECÍFICA
Otezla se asocia con un aumento de la depresión. En estudios clínicos, algunos pacientes informaron depresión o comportamiento de suicidio mientras tomaban Otezla. Algunos de ellos suspendieron el medicamento debido a la depresión. Antes de comenzar el tratamiento con Otezla, informe a su médico si ha tenido sentimientos de depresión o ideas o comportamientos de suicidio. Asegúrese de informar a su médico si presenta alguno de estos síntomas u otros cambios de humor, o si empeoran, durante el tratamiento con Otezla.

Haga clic aquí para obtener la información de prescripción completa

Qué esperar después de empezar el tratamiento con Otezla

Las primeras semanas con Otezla

Todos los medicamentos conllevan cierto riesgo de efectos secundarios y Otezla no es la excepción. Los efectos secundarios suelen aparecer durante las primeras semanas de tratamiento y tienden a desaparecer a medida que continúa tomándolo. Puede comunicarse con su médico si necesita más ayuda para controlar los efectos secundarios.

"Es totalmente normal experimentar algunos síntomas estomacales, en especial durante las primeras semanas de tratamiento. **Mis efectos secundarios disminuyeron con el tiempo. Me alegra haber continuado con el tratamiento".**

Pat
Paciente real de Otezla*

*Los pacientes han recibido una compensación por su tiempo.

Efectos secundarios:

Efectos secundarios más frecuentes de Otezla en comparación con el placebo (comprimido de azúcar), según se observó en estudios clínicos.

Efectos secundarios observados en adultos con **psoriasis en placas de moderada a grave**:

Los efectos secundarios más comunes (hasta la semana 16)	**Otezla** (920 personas)	**Placebo** (560 personas)
Diarrea	17 %	6 %
Náuseas	17 %	7 %
Infección del tracto respiratorio superior	9 %	6 %
Dolor de cabeza tensional	8 %	4 %
Dolor de cabeza	6 %	4 %

En un estudio clínico de Otezla, un total de 595 adultos con p**soriasis en placas de leve a moderada** recibieron Otezla 30 mg dos veces al día (297 personas) o placebo dos veces al día (298 personas). En general, la seguridad observada en el grupo de Otezla fue similar a la observada en las personas con psoriasis en placas de moderada a grave.

Efectos secundarios observados en adultos con artropatía psoriásica:

Los efectos secundarios más comunes (hasta la semana 16)	**Otezla** (493 personas)	**Placebo** (490 personas)
Diarrea	8 %	2 %
Náuseas	9 %	3 %
Dolor de cabeza	6 %	2 %

Otezla se probó durante un período de al menos 6 meses en estudios clínicos en los que participaron adultos con un diagnóstico de artropatía psoriásica activa.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE ESPECÍFICA
Otezla puede provocar diarrea intensa, náuseas y vómitos, especialmente durante las primeras semanas de tratamiento. El uso en pacientes de edad avanzada y el uso de ciertos medicamentos en combinación con Otezla parece aumentar el riesgo de complicaciones derivadas de la diarrea intensa, las náuseas o los vómitos. Informe a su médico si presenta alguna de estas afecciones.

Haga clic aquí para obtener la información de prescripción completa

Otezla® (apremilast) 30mg tablets

Estamos aquí para apoyarle

Regístrese en Amgen® SupportPlus para obtener apoyo complementario por parte de un profesional de enfermería dedicado del programa Nurse Partners*, que le brindará recursos para ayudarle a acceder a los medicamentos de Amgen que se le hayan recetado.

Si tiene preguntas, llame al **1-844-4OTEZLA (1-844-468-3952)** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

*Los profesionales de enfermería del programa Nurse Partners de Amgen solo están disponibles para pacientes a los que se les recetan ciertos productos Amgen. Ellos no forman parte de su equipo de tratamiento y no brindan asesoramiento médico, servicios de enfermería ni servicios de gestión de casos. Los profesionales de enfermería del programa Nurse Partners de Amgen no inyectarán a los pacientes medicamentos de Amgen. Los pacientes siempre deben consultar a su proveedor de atención médica sobre decisiones médicas o inquietudes sobre el tratamiento.

Haga clic aquí para obtener la información de prescripción completa

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

USOS APROBADOS

Otezla® (apremilast) es un medicamento recetado que se usa para tratar las siguientes enfermedades en pacientes adultos:

- Psoriasis en placas para quienes la fototerapia o el tratamiento sistémico son apropiados.
- Artropatía psoriásica activa.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No debe tomar Otezla si es alérgico al apremilast o a cualquiera de los ingredientes de Otezla. Otezla puede provocar reacciones alérgicas que, en ocasiones, pueden ser graves. Suspenda el uso de Otezla y llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave: dificultad para respirar o tragar, bultos elevados (urticaria), erupción o picazón, o hinchazón del rostro, labios, lengua, garganta o brazos.

Otezla puede provocar diarrea intensa, náuseas y vómitos, especialmente durante las primeras semanas de tratamiento. El uso en pacientes de edad avanzada y el uso de ciertos medicamentos en combinación con Otezla parece aumentar el riesgo de complicaciones derivadas de la diarrea intensa, las náuseas o los vómitos. Informe a su médico si presenta alguna de estas afecciones.

Otezla se asocia con un aumento de la depresión. En estudios clínicos, algunos pacientes informaron depresión o comportamiento de suicidio mientras tomaban Otezla. Algunos de ellos suspendieron el medicamento debido a la depresión. Antes de comenzar el tratamiento con Otezla, informe a su médico si ha tenido sentimientos de depresión o ideas o comportamientos de suicidio. Asegúrese de informar a su médico si presenta alguno de estos síntomas u otros cambios de humor, o si empeoran, durante el tratamiento con Otezla.

Algunos pacientes que tomaron Otezla perdieron peso corporal. El médico debe controlar su peso con regularidad. Si se produce una pérdida de peso significativa o inexplicable, el médico decidirá si debe continuar tomando Otezla.

Algunos medicamentos pueden hacer que Otezla sea menos eficaz, por lo que no deben tomarse en combinación con él. Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los recetados y los de venta libre.

Los efectos secundarios más frecuentes de Otezla incluyen diarrea, náuseas, infección de las vías respiratorias altas, cefalea tensional y dolor de cabeza. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Otezla. Pregunte a su médico sobre otros posibles efectos secundarios. Informe a su médico sobre cualquier efecto secundario que le moleste o no desaparezca.

Informe a su médico si está embarazada o si tiene previsto quedar embarazada o amamantar. Le recomendamos que informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-332-1088.

Haga clic aquí para obtener la información de prescripción completa

Otezla® (apremilast) 30mg tablets

AMGEN®

© 2024 Amgen Inc. Todos los derechos reservados.
USA-407-83756 04/24

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No debe tomar Otezla si es alérgico al apremilast o a cualquiera de los ingredientes de Otezla.

Haga clic aquí para obtener la información de prescripción completa