

OBTENGA EL COPAGO DE \$0\*

 **Otezla**<sup>®</sup>  
(apremilast) 30mg  
tablets

Muéstrese *más*

Si tiene **psoriasis en placas** de moderada a grave o **artritis psoriásica**, los pequeños momentos pueden tener un gran significado.

*un pequeño chapuzón*

*un gran día*

Otezla es un medicamento de venta con receta, aprobado para el tratamiento de pacientes adultos que padecen de psoriasis en placas de moderada a grave para quienes resulta adecuada la fototerapia o la terapia sistémica.

También está aprobado para el tratamiento de pacientes adultos con artritis psoriásica activa.

#### INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD

No debe tomar Otezla si es alérgico al apremilast o a alguno de los componentes de Otezla.

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 15.

\*Se aplican ciertas restricciones.

**1-844-4Otezla** | [otezla.com/copay](http://otezla.com/copay)



## Contenido:

### Por qué Otezla es diferente

- ¿Cómo empiezan la psoriasis en placas y la artritis psoriásica? ..... 3
- Cómo funciona Otezla ..... 4

### Psoriasis en placas

- Resultados comprobados ..... 5
- Resultados en la psoriasis del cuero cabelludo ..... 6
- Comprender los efectos secundarios.... 7
- La historia de Sarah ..... 8

### Artritis psoriásica

- Resultados comprobados ..... 9
- Comprender los efectos secundarios.... 10
- La historia de Cindy ..... 11

### Asistencia y más

- Programa SupportPlus™ de Otezla ..... 12
- Ahorros y asistencia con los costos ..... 13
- Cómo trabajar con su equipo de atención médica ..... 14
- Información Importante de Seguridad ..... 15



¿Le está resultando su tratamiento actual?

Si la respuesta es negativa, piense en Otezla: una tableta que trata la enfermedad de manera diferente.

\*Se aplican ciertas restricciones; la elegibilidad no se basa en los ingresos.

†Fuente: Symphony Health Solutions PrescriberSource PatientFocus, metodología de propiedad de Amgen. Nov2019-ene2020. Los datos incluyen solo las formulaciones para uso oral para las recetas etiquetadas con una indicación para la psoriasis en placas.

‡Fuente: Symphony Health Solutions PrescriberSource PatientFocus, metodología de propiedad de Amgen. Nov2019-ene2020. Los datos incluyen solo las formulaciones para uso oral para las recetas etiquetadas con una indicación para la artritis psoriásica.



No es una inyección ni una crema que deja restos:

Otezla es una tableta



En los casos de psoriasis en placas de moderada a grave

Se puede lograr una piel un 75% más clara después de tan solo 4 meses de tratamiento, con una reducción del enrojecimiento, el espesor y la descamación de las placas

Otezla también tiene resultados en la psoriasis del cuero cabelludo de moderada a grave



En los casos de artritis psoriásica

Otezla puede ayudar a reducir la hinchazón, la sensibilidad y el dolor de las articulaciones de algunas personas y a mejorar la capacidad de realizar las actividades físicas de la vida diaria después de tan solo 4 meses de tratamiento



No se necesitan análisis de sangre

La Información sobre la Prescripción de Otezla no exige análisis de sangre iniciales o de rutina



Una tableta que actúa diferente

Otezla es una tableta que actúa dentro del cuerpo



Otezla es la tableta de marca recetada #1 para la psoriasis en placas<sup>†</sup> o para la artritis psoriásica<sup>‡</sup>

### Efectos secundarios de Otezla

Los efectos secundarios más comunes de Otezla en los ensayos clínicos de personas con psoriasis en placas fueron diarrea, náuseas, infección de las vías respiratorias superiores, dolor de cabeza por tensión y dolor de cabeza común.

Los efectos secundarios más comunes de Otezla en las personas con artritis psoriásica fueron diarrea, náuseas y dolor de cabeza común.

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 15.

# ¿Cómo empiezan la psoriasis en placas y la artritis psoriásica?

La psoriasis en placas y la artritis psoriásica son **enfermedades crónicas**, lo que significa que están siempre ahí (incluso cuando usted no tiene ningún síntoma).

Tanto la psoriasis en placas como la artritis psoriásica están asociadas con una **inflamación hiperactiva dentro del cuerpo**. Las investigaciones de laboratorio han demostrado que una enzima conocida como fosfodiesterasa 4 (PDE4), que se encuentra en las células, contribuye a la inflamación.

Se cree que la **inflamación hiperactiva es responsable de los síntomas** de la psoriasis en placas y la artritis psoriásica.

## El papel de la inflamación hiperactiva



### En la psoriasis en placas:

Se cree que acelera el ciclo de crecimiento de las células de la piel →

Con el tiempo, las células de la piel se acumulan y producen placas rojas y elevadas en la piel que dan comezón



### En la artritis psoriásica:

Se cree que hace que el tejido que rodea las articulaciones se engrose →

Con el tiempo, el tejido engrosado provoca hinchazón y dolor en las articulaciones

## ¿Lo sabía?

Se estima que entre el **70% y el 90% de las personas** con artritis psoriásica pueden tener psoriasis del cuero cabelludo.

Siga leyendo para obtener más información en la próxima página. →



## Una tableta que actúa *diferente*



Si bien no se conoce completamente la manera en la que actúa Otezla, esto es lo que se sabe:

- Otezla actúa **dentro de cuerpo** para tratar la psoriasis en placas o la artritis psoriásica.
- Específicamente, Otezla reduce la **PDE4**, una enzima localizada dentro de las células que causa inflamación.
- Se cree que la reducción de la actividad de la PDE4 reduce la **inflamación hiperactiva**.
- Una menor inflamación puede hacer que los síntomas (de la psoriasis en placas y la artritis psoriásica) se reduzcan.

“Otezla actúa desde dentro del cuerpo para reducir la inflamación”.

—**DRA. ERIN BOH**, dermatóloga certificada por la Junta



Vea un video para conocer más de cerca cómo funciona Otezla para tratar la psoriasis en placas de moderada a grave o la artritis psoriásica en [otezla.com/works](https://otezla.com/works)

## ¿Qué es lo que hace que Otezla sea diferente de otros *tratamientos*?

- Otezla **no** es una inyección ni una crema que deja restos: es una tableta.
- Otezla es una tableta que ayuda a **mejorar la psoriasis del cuero cabelludo**, una zona difícil de tratar.
- La Información sobre la Prescripción de Otezla **no exige análisis de sangre**.



## Resultados comprobados en la psoriasis en placas

Está comprobado que Otezla es una tableta que lo ayuda a tener una piel más clara

ANTES DE OTEZLA



CON OTEZLA A LAS 16 SEMANAS



ANTES DE OTEZLA



CON OTEZLA A LAS 16 SEMANAS



ANTES DE OTEZLA



CON OTEZLA A LAS 16 SEMANAS



Pacientes reales de Otezla. No todas las personas responden a Otezla, y quienes responden, pueden hacerlo de distintas maneras.

Vea más fotos de antes y después en [otezla.com/images](http://otezla.com/images)



**¿Cansado de probar las mismas opciones de tratamiento?**

Hable con su médico para ver si Otezla podría ser adecuado para usted.

## Tener una piel más clara es posible con Otezla

Se demostró en estudios que después de solo 4 meses con Otezla, **se puede lograr** una **reducción del 75%** de la psoriasis en placas de moderada a grave.



Vea un video para obtener más información sobre cómo Otezla puede ayudarlo en [otezla.com/results-video](http://otezla.com/results-video)



*¿Lo sabía?*

La gravedad de la psoriasis no solo se mide según los síntomas físicos de la piel. Es importante tener en cuenta todos los factores que la psoriasis puede tener al hablar sobre las opciones de tratamiento con su médico.

### Efectos secundarios comunes de Otezla

Los efectos secundarios más comunes de Otezla fueron diarrea, náuseas, infección de las vías respiratorias superiores, dolor de cabeza por tensión y dolor de cabeza común.

### Información Seleccionada de Seguridad

**Otezla puede causar diarrea, náuseas y vómitos intensos, sobre todo en las primeras semanas de tratamiento.**

El uso de este medicamento en pacientes de edad avanzada, así como el uso simultáneo con determinados medicamentos, podría aumentar el riesgo de tener diarrea, náuseas o vómitos. Dígame a su médico si tiene alguno de estos síntomas.

## Está comprobado que Otezla trata la psoriasis del cuero cabelludo de moderada a grave

El cuero cabelludo es una de las zonas más afectadas por la psoriasis en placas.

Otezla es una tableta que trata la enfermedad por debajo de la piel, a diferencia de los tópicos como cremas o champús, que se aplican directamente al cuero cabelludo.

### Está comprobado que Otezla ayuda a tener una piel más clara en el cuero cabelludo

En un ensayo clínico, 201 personas que tomaban Otezla se compararon con 102 personas que tomaban un placebo (tableta de azúcar).



El 43.3% de las personas que tomaron Otezla vieron una mejora en la psoriasis del cuero cabelludo después de solo 4 meses de tratamiento, en comparación con el 13.7% que tomó el placebo.

ANTES DE OTEZLA



CON OTEZLA A LAS 16 SEMANAS



Paciente real del ensayo clínico. No todas las personas responden a Otezla, y quienes responden, pueden hacerlo de distintas maneras.



**"A los cuatro meses de tomar Otezla, mi piel había mejorado. Ahora tengo los codos y el cuero cabelludo más claros".**

**–Sarah, paciente de Otezla desde 2018**

## Está comprobado que Otezla *también* ayuda a mejorar la comezón tanto en el cuero cabelludo como en todo el cuerpo

Algunas personas también experimentaron una reducción de la comezón en el cuero cabelludo y en todo el cuerpo después de solo 4 meses de tratamiento. A continuación, se muestra el porcentaje de personas que experimentaron una mejora mientras tomaban Otezla.

### Mejora en la comezón del cuero cabelludo

**47.1%**  
de personas

El 47.1% de las personas que tomaron Otezla vieron una reducción en la comezón del cuero cabelludo después de solo 4 meses, en comparación con el 21.1% que tomó el placebo.

### Mejora en la comezón de todo el cuerpo

**45.5%**  
de personas

El 45.5% de las personas que tomaron Otezla vieron una reducción en la comezón de todo el cuerpo después de solo 4 meses, en comparación con el 22.5% que tomó el placebo.

### Efectos secundarios comunes de Otezla

Los efectos secundarios más comunes de Otezla que arrojó el estudio de psoriasis del cuero cabelludo fueron diarrea, náuseas, dolor de cabeza común y vómitos.

Consulte la página 7 para obtener más información.

### Información Seleccionada de Seguridad

Otezla está relacionado con un aumento de la depresión. En estudios clínicos, algunos pacientes reportaron depresión o comportamientos suicidas mientras tomaban Otezla. Algunos pacientes interrumpieron la administración de Otezla debido a la depresión. Antes de comenzar a tomar Otezla, indíquele a su médico si ha tenido sentimientos de depresión, o pensamientos o comportamientos suicidas. Asegúrese de avisarle a su médico si alguno de estos síntomas u otros cambios en su estado de ánimo aparecen o empeoran durante el tratamiento con Otezla.

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 15.

## Efectos secundarios de Otezla en la psoriasis en placas

### Otezla en los estudios clínicos

En los estudios clínicos con Otezla participaron 1426 adultos con psoriasis en placas de moderada a grave que eran candidatos para recibir fototerapia o terapia sistémica. En cada estudio, algunas personas tomaron 30 mg de Otezla dos veces al día, y otras tomaron un placebo (tableta de azúcar).


### Efectos secundarios

La siguiente tabla incluye los efectos secundarios más comunes informados por las personas que tomaron Otezla, en comparación con los informados por las personas que tomaron placebo (tableta de azúcar).

Efectos secundarios más comunes (hasta la semana 16)	Otezla (920 personas)	Placebo (506 personas)
Diarrea	17% de los pacientes	6% de los pacientes
Náuseas	17%	7%
Infección de las vías respiratorias superiores	9%	6%
Dolor de cabeza por tensión	8%	4%
Dolor de cabeza común	6%	4%

## Los efectos secundarios gastrointestinales más comunes con el tiempo

En la mayoría de las personas, los efectos secundarios de diarrea y náuseas ocurrieron dentro de las primeras 2 semanas de tratamiento y tendieron a desaparecer con el transcurso del tiempo, sin la interrupción de Otezla. En algunos casos, los pacientes con diarrea o náuseas intensas tuvieron que ser hospitalizados. Dígale a su médico si tiene algún efecto secundario.



## Efectos secundarios gastrointestinales más comunes con el tiempo (continuación)



\*En estos estudios participaron 920 adultos con psoriasis en placas de moderada a grave que inicialmente recibieron 30 mg de Otezla dos veces por día.

\*"n" representa la cantidad de personas que participaron en los estudios durante las semanas indicadas.

## Efectos secundarios comunes de Otezla en la psoriasis del cuero cabelludo

En otro estudio clínico de Otezla participaron adultos con psoriasis del cuero cabelludo de moderada a grave.

La siguiente tabla incluye los efectos secundarios más comunes de este estudio clínico informados por las personas que tomaron 30 mg de Otezla dos veces por día, en comparación con los informados por las personas que tomaron placebo (tableta de azúcar).

Efectos secundarios más comunes (hasta la semana 16)	Otezla (200 personas)	Placebo (102 personas)
Diarrea	31% de los pacientes	11% de los pacientes
Náuseas	22%	6%
Dolor de cabeza común	12%	5%
Vómitos	6%	2%



## La historia de Sarah: *“Estoy agradecida de tener una terapia oral que me funcione”.*

La pesca con mosca es una de las mayores pasiones de Sarah. Cuando está al aire libre se siente más en paz consigo misma y con el mundo que la rodea. Sin embargo, cuando la psoriasis en placas entró en escena y apareció en la piel y el cuero cabelludo (junto con enrojecimiento, descamación y escamas), salir era lo último que quería hacer. Por el contrario, quería quedarse en casa y esconder la piel al mundo. Inicialmente, su dermatólogo le recetó champús y cremas tópicas, pero no le dieron los resultados que deseaba.


“En un momento dado, tuve que ponerme este aceite en las entradas y luego dormir con un gorro de ducha desechable... el aceite blanqueó las fundas de la almohada, lo que me recordaba aún más mis problemas”.

### Por qué eligió Otezla

Frustrada con sus opciones de tratamiento, Sarah decidió buscar una segunda opinión. Su nuevo dermatólogo le sugirió lo siguiente: “Probemos algo diferente, no una crema”.

El dermatólogo de Sarah le recomendó Otezla, y después de una conversación sobre los efectos secundarios y los resultados, comenzó a tomar el Starter Pack.

A los 4 meses, su piel había mejorado. Ahora tiene los codos y el cuero cabelludo más claros. Puede volver a estar al aire libre y se siente mejor en su propia piel.



Escuche a más personas que toman  
Otezla en [OtezlaStories.com](https://OtezlaStories.com)



[otezla.com](https://otezla.com)

“Me siento mejor sabiendo que tengo un tratamiento que me está funcionando”.

—SARAH  
Paciente de Otezla desde 2018



## Resultados comprobados en la artritis psoriásica

Para algunas personas, después de solo 4 meses, Otezla demostró lo siguiente:



**Reduce la hinchazón, la sensibilidad y el dolor de las articulaciones**



**Mejora la capacidad de realizar las actividades físicas de la vida diaria**

La Información sobre la Prescripción de Otezla no exige análisis de sangre, así que una vez que su médico le recete Otezla, puede empezar el tratamiento.



Vea un video para obtener más información sobre cómo Otezla puede ayudarlo en [otezla.com/psa-results-video](http://otezla.com/psa-results-video)

### Efectos secundarios comunes de Otezla

Los efectos secundarios más comunes de Otezla fueron diarrea, náuseas y dolor de cabeza común.

### Información Seleccionada de Seguridad

Algunos pacientes que toman Otezla perdieron peso. Su médico debe monitorear su peso regularmente. Si se produce una pérdida de peso significativa o inexplicable, su médico decidirá si debe continuar con la administración de Otezla.

Es posible que algunos medicamentos reduzcan la eficacia de Otezla y, por lo tanto, no se deben administrar junto con Otezla. Comuníquese a su médico todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta.



¿Está bajo tratamiento con metotrexato o AINE\* (un tipo común de analgésico)?  
**Otezla es otro tipo de tableta**



\*Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos.

## Efectos secundarios en la artritis psoriásica

Otezla se probó en estudios clínicos, en 1493 adultos con artritis psoriásica activa. A todos los pacientes de estos estudios se les había diagnosticado artritis psoriásica desde hacía al menos 6 meses. Tenían entre 18 y 83 años.

En cada estudio, algunas personas tomaron 30 mg de Otezla dos veces al día, y otras tomaron un placebo (tableta de azúcar).

### Efectos secundarios comunes de Otezla

La siguiente tabla incluye los efectos secundarios más comunes informados por las personas que tomaron Otezla, en comparación con los informados por las personas que tomaron placebo (tableta de azúcar).

Efectos secundarios más comunes (hasta la semana 16)*	Otezla (493 personas)	Placebo (490 personas)
Náuseas	9% de los pacientes	3% de los pacientes
Diarrea	8%	2%
Dolor de cabeza común	6%	2%

\*Datos del Día 6 al Día 112 (el periodo de ajuste de la dosis fue del Día 1 al Día 5, durante los cuales se aumentó gradualmente la dosis hasta alcanzar la dosis recomendada de 30 mg dos veces al día).

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Otezla. Indíquelo a su médico cualquier efecto secundario que le cause molestias o que no desaparezca. Si tiene algún efecto secundario, consulte a su médico.



**“Cuando no veía ninguna mejora con los medicamentos que tomaba, empecé a buscar algo que actuara diferente”.**

—Cindy, paciente de Otezla desde 2016



Vea un video para obtener más información sobre los efectos secundarios potenciales en [otezla.com/psa-safety-video](http://otezla.com/psa-safety-video)



[otezla.com/psa](http://otezla.com/psa)

## Efectos secundarios más comunes con el tiempo

En la mayoría de las personas, estos efectos secundarios comunes de dolor de cabeza común, diarrea y náuseas ocurrieron dentro de las primeras 2 semanas de tratamiento y tendieron a desaparecer con el transcurso del tiempo, sin la interrupción de Otezla. En algunos casos, los pacientes con diarrea o náuseas intensas tuvieron que ser hospitalizados. Avísele a su médico si tiene alguno de estos síntomas.



\*En estos estudios participaron 497 adultos con artritis psoriásica activa que inicialmente recibieron 30 mg de Otezla dos veces por día.

“n” representa la cantidad de personas que participaron en los estudios durante las semanas indicadas.

## La historia de Cindy: *“Estoy volviendo al juego”.*

Cindy siempre ha sido confiada y extrovertida. Le encanta hacer amigos y practicar deportes, especialmente softball y bolos.

En 2009, mientras se preparaba para recibir a los gemelos, aparecieron manchas secas y escamosas en su cuerpo y comenzó a sentir una hinchazón dolorosa en las rodillas y la columna vertebral. Su médico le diagnosticó artritis psoriásica. “Tuve que dejar de practicar los deportes que amaba. Me tomé un largo descanso de la actividad física y empecé a aumentar de peso”. Al haber sido activa toda su vida, Cindy no podía creer que estaba padeciendo algo que la estaba sacando del juego.

### Por qué eligió Otezla

Cindy decidió contraatacar. Después de años de probar diferentes tratamientos con pocos cambios positivos, su continua investigación hizo que conociera Otezla. A Cindy le gustó que Otezla fuera una tableta y que fuera diferente de todos los otros tratamientos que había probado antes. Después de hablar sobre el posible resultado y los efectos secundarios con su médico, comenzó a tomar Otezla.

Después de unos meses, Cindy notó alivio en las articulaciones. Y con menos hinchazón, sensibilidad y dolor, ahora puede pasar más tiempo con sus hijos y mostrarles una mejor versión de sí misma.



Escuche más historias de personas que toman Otezla.  
Vea sus videos en [OtezlaPsAStories.com](https://OtezlaPsAStories.com)



[otezla.com/psa](https://otezla.com/psa)

“Estoy muy agradecida por los resultados que he visto con Otezla”.

—CINDY

Paciente de Otezla desde 2016



## Obtenga más información sobre el programa SupportPlus™ de Otezla



Otezla SupportPlus es un programa gratuito diseñado para ayudarlo a comenzar y mantener el rumbo con Otezla.



**Asistencia del seguro:** trabajaremos con su compañía de seguros en la cobertura de Otezla

Ayuda para pagar el tratamiento con la **tarjeta de copago de \$0\***



**Apoyo de enfermeros 24/7**

Recursos gratuitos, como la **aplicación GOtezla®** con recordatorios diarios de tratamiento




\*Se aplican ciertas restricciones; la elegibilidad no se basa en los ingresos; la persona debe tener 18 años o más. Esta oferta no es válida para personas elegibles para el reembolso de este producto, en forma total o parcial, a través de Medicaid, Medicare o programas estatales o federales similares. Oferta no válida para pacientes que paguen en efectivo. Las personas que no sean elegibles pueden llamar al 1-844-4OTEZLA para analizar otras oportunidades de asistencia financiera.

## 3 maneras fáciles de inscribirse

Inscribirse en SupportPlus es fácil, y los servicios son gratuitos para todos los inscritos. Para afiliarse:

1. Visite [otezla.com/supportplus](https://www.otezla.com/supportplus).
2. Llame al **1-844-4OTEZLA** (1-844-468-3952).
3. Solicite a su médico que lo inscriba cuando le recete Otezla.



## Ahorros y asistencia con los costos de Otezla

La mayoría de las personas que tienen seguro privado o comercial no tienen gastos de bolsillo por la receta. Una vez que le receten Otezla, usted tendrá la misma oportunidad de ahorrar.



Obtenga la oferta de copago de \$0 de 3 maneras diferentes:

- Visite [otezla.com/copay](http://otezla.com/copay).
- Llame al **1-844-4OTEZLA** (1-844-468-3952).
- Pregunte a su médico sobre la tarjeta de copago de \$0.

## Nosotros nos encargamos

No debería tener problemas para recibir sus medicamentos. Si tiene seguro privado y tiene demoras, o si su seguro privado no cubre Otezla, es posible que sea elegible para recibir **medicamentos sin cargo** a través del **Programa Bridge de Otezla**.

Si tiene seguro del gobierno (Medicare o Medicaid), o no tiene seguro o tiene seguro insuficiente, puede ser elegible para el **Programa de asistencia al paciente**.



Por preguntas sobre ahorros en Otezla:  
Llame al **1-844-4OTEZLA**  
(1-844-468-3952)



**Otezla**<sup>®</sup>  
(apremilast) 30mg tablets

[otezla.com](http://otezla.com)



## Descargue GOtezla<sup>®</sup>

La aplicación GOtezla tiene recordatorios de los medicamentos, herramientas para realizar un seguimiento de su progreso y consejos sobre qué esperar durante el tratamiento; **y la puede descargar gratis.**



Descargue la aplicación aquí



## Cómo trabajar con su equipo de atención médica

La psoriasis en placas y la artritis psoriásica son enfermedades crónicas, lo que significa que están siempre ahí (incluso cuando usted no tiene ningún síntoma). Por eso es extremadamente importante tener un diálogo abierto y honesto con su equipo de atención médica.



Asegúrese de estar recibiendo el tratamiento adecuado para usted:

### Pregúntese

- ¿Estoy satisfecho con mi tratamiento actual?
- ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a mi tratamiento actual?
- ¿Tengo que alejarme de las cosas que amo?
- ¿Estoy listo para algo diferente?

### Pregunte a su médico

- ¿Qué es lo que hace que Otezla sea diferente?
- ¿Cuánto tiempo demora Otezla en actuar?
- ¿Cuáles son los síntomas que podré tratar con Otezla?
- ¿Cómo puedo ahorrar en Otezla?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios de Otezla?
- ¿El uso de Otezla requiere algún análisis de sangre?



"Voy a las consultas con mi médico con preguntas, entonces siempre recibo la información que necesito para sentirme cómoda".

—Errin

Paciente de Otezla desde 2016

Visite [otezla.com/learn](https://www.otezla.com/learn) para ver a una paciente, una dermatóloga y una especialista en SupportPlus™ de Otezla hablar sobre lo que hace que Otezla sea diferente.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No debe tomar Otezla si es alérgico al apremilast o a alguno de los componentes de Otezla.

Otezla puede causar diarrea, náuseas y vómitos intensos, sobre todo en las primeras semanas de tratamiento. El uso de este medicamento en pacientes de edad avanzada, así como el uso simultáneo con determinados medicamentos, podría aumentar el riesgo de tener diarrea, náuseas o vómitos. Dígale a su médico si tiene alguno de estos síntomas.

Otezla está relacionado con un aumento de la depresión. En estudios clínicos, algunos pacientes reportaron depresión o comportamientos suicidas mientras tomaban Otezla. Algunos pacientes interrumpieron la administración de Otezla debido a la depresión. Antes de comenzar a tomar Otezla, indíquelo a su médico si ha tenido sentimientos de depresión, o pensamientos o comportamientos suicidas. Asegúrese de avisarle a su médico si alguno de estos síntomas u otros cambios en su estado de ánimo aparecen o empeoran durante el tratamiento con Otezla.

Algunos pacientes que toman Otezla perdieron peso. Su médico debe monitorear su peso regularmente. Si se produce una pérdida de peso significativa o inexplicable, su médico decidirá si debe continuar con la administración de Otezla.

Es posible que algunos medicamentos reduzcan la eficacia de Otezla y, por lo tanto, no se deben administrar junto con Otezla. Comuníquelo a su médico todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta.

Los efectos secundarios de Otezla incluyen diarrea, náuseas, vómitos, infección de las vías respiratorias superiores, secreción nasal, estornudos o congestión, dolor abdominal, dolor de cabeza por tensión y dolor de cabeza común. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Otezla. Pregúntele a su médico acerca de otros efectos secundarios potenciales. Indíquelo a su médico cualquier efecto secundario que le cause molestias o que no desaparezca.

Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o planea amamantar. Otezla no se ha estudiado en mujeres embarazadas o que estén amamantando.

Se recomienda informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la FDA. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch), o llame al 1-800-332-1088.

Haga clic aquí para consultar la Información Completa sobre la Prescripción.



¿Tiene preguntas o necesita ayuda?  
*Llámenos.*

Nuestro equipo está disponible de lunes a viernes, de 8 AM a 8 PM, hora del Este, al **1-844-4OTEZLA** (1-844-468-3952).

Pregúntele a su médico acerca de *Otezla*.  
¡Con el *Starter Pack para 2 semanas* puede comenzar de inmediato!